



ROTEIRO PARA ATENDIMENTO EM PCR CLÍNICA



ELABORADO POR: EPAMINONDAS DE SOUZA MENDES JUNIOR, ANDRÉ DANTAS ZIMMERMANN,
KÁTIA REIS ALVES

DISCIPLINA DE PRIMEIROS SOCORROS – MEDICINA – EBMS – 2023

FONTE: AMERICAN HEART ASSOCIATION, CANADIAN RED CROSS, AMERICAN RED CROSS,
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

SEQUÊNCIA DE ATENDIMENTO NO ADULTO:

1. VERIFICAR A SEGURANÇA DO LOCAL
2. TESTAR A RESPONSABILIDADE (TOQUE NOS OMBROS E CHAME POR ELA). VÍTIMA NÃO RESPONDE.
3. PEDIR AJUDA. SOLICITAR QUE LIGUE PARA 192 E REFORCE O DEA.
4. VERIFICAR SE HÁ PULSO (PULSO CAROTÍDEO E RESPIRAÇÃO (OBSERVE OS MOVIMENTOS TORÁCICOS) SIMULTANEAMENTE. TESTAR ENTRE 5 E 10 SEGUNDOS. NÃO MAIS QUE ISSO, NÃO MENOS QUE ISSO.
 - A. SE A RESPIRAÇÃO ESTIVER NORMAL E COM PULSO, MONITORE A VÍTIMA ATÉ CHEGADA DO SOCORRO
 - B. SE HOUVER PULSO E NÃO TIVER RESPIRAÇÃO (OU TIVER GASPING), ADMINISTRE VENTILAÇÕES DE RESGATE, 1 VENTILAÇÃO A CADA 5-6 SEGUNDOS. A CADA 2 MINUTOS VERIFIQUE NOVAMENTE O PULSO E SE ESTIVER SEM, INICIE RCP.
 - C. SEM RESPIRAÇÃO OU COM GASPING E SEM PULSO, INICIE RCP.

RCP

1. INICIE CICLOS DE 30 COMPRESSÕES E 2 RESPIRAÇÕES. USE O DEA ASSIM QUE ESTIVER DISPONÍVEL
2. DEA CHEGANDO, SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO DEA. SE ESTIVER SOZINHO, VOCÊ MESMO COLOCA O DEA NO PACIENTE, SE QUEM TROUXER O DEA SOUBER INSTALAR, ELE INSTALA ENQUANTO VOCÊ CONTINUA AS COMPRESSÕES.
3. A CADA 2 MINUTOS O DEA IRÁ REANALISAR O RITMO, E APÓS O CHOQUE (QUANDO INDICADO, CONTINUE A RCP ATÉ A CHEGADA DO SUPORTE AVANÇADO OU ATÉ A VÍTIMA SE MEXER.

SEQUÊNCIA DE ATENDIMENTO PEDIÁTRICO

1. VERIFICAR A SEGURANÇA DO LOCAL
2. TESTAR A RESPONSABILIDADE (TOQUE NO OMBRO DA CRIANÇA OU NO CALCANHAR DO LACTENTE). VÍTIMA NÃO RESPONDE.
3. PEDIR AJUDA. SOLICITAR QUE LIGUE PARA 192 E REFORCE O DEA.
4. VERIFICAR SE HÁ PULSO (PULSO BRAQUIAL NOS LACTENTES E CAROTÍDEO NAS CRIANÇAS) E RESPIRAÇÃO (OBSERVE OS MOVIMENTOS TORÁDICOS) SIMULTANEAMENTE. TESTAR ENTRE 5 E 10 SEGUNDOS. NÃO MAIS QUE ISSO, NÃO MENOS QUE ISSO.
 - A. SE A RESPIRAÇÃO ESTIVER NORMAL E COM PULSO, MONITORE A VÍTIMA ATÉ CHEGADA DO SOCORRO
 - B. SE HOUVER PULSO (ACIMA DE 60BPM E SEM SINAIS DE HIOPERFUSÃO) E NÃO TIVER RESPIRAÇÃO (OU TIVER GASPING), ADMINISTRE VENTILAÇÕES DE RESGATE, 1 VENTILAÇÃO A CADA 2-3 SEGUNDOS. A CADA 2 MINUTOS VERIFIQUE NOVAMENTE O PULSO E SE ESTIVER SEM, INICIE RCP.
 - C. SEM RESPIRAÇÃO OU COM GASPING E SEM PULSO (OU ABAIXO DE 60BPM OU COM SINAIS DE HIOPERFUSÃO), INICIE RCP.

RCP

1. INICIE CICLOS DE 30 COMPRESSÕES E 2 RESPIRAÇÕES (1 SOCORRISTA) OU 15:2 (2 SOCORRISTAS). USE O DEA ASSIM QUE ESTIVER DISPONÍVEL
2. DEA CHEGANDO, SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO DEA. SE ESTIVER SOZINHO, VOCÊ MESMO COLOCA O DEA NO PACIENTE, SE QUEM TROUXER O DEA SOUBER INSTALAR, ELE INSTALA ENQUANTO VOCÊ CONTINUA AS COMPRESSÕES.
3. A CADA 2 MINUTOS O DEA IRÁ REANALISAR O RITMO, E APÓS O CHOQUE (QUANDO INDICADO, CONTINUE A RCP ATÉ A CHEGADA DO SUPORTE AVANÇADO OU ATÉ A VÍTIMA SE MEXER.